

SPIS TREŚCI CONTENTS

Melekse Akin, Sadiye Peral Eyduran, Sezai Ercisli, Ilker Yilmaz, Ozlem Cakir	
Phytochemical profiles of wild grown blackberry and mulberry in Turkey	3
Fitochemiczny profil dzikiej czarnej jagody i morwy w Turcji	
Carlos Alberto Bouzo, Norberto Francisco Gariglio	
Relationship between different physical properties of tomato fruits and water loss during postharvest	13
Relacje między różnymi fizycznymi właściwościami owoców pomidora a utratą wody po zbiorze	
Bożena Denisow, Monika Strzałkowska-Abramek, Elżbieta Pogroszewska, Halina Laskowska	
The effect of Pentakeep®-v application on flower traits and nectar production in <i>Hosta</i> Tratt. 'Krossa Regal'	27
Wpływ nawozu pentakeep®-v na kwitnienie i nektarowanie funkcii (<i>Hosta</i> Tratt.) 'Krossa Regal'	
Zehra Tuğba Abaci, Mozhgan Zarifikhosroshahi, Ebru Kafkas, Emre Sevindik	
Chemical composition, volatiles, and antioxidant activity of <i>Rosa iberica</i> Stev. hips.	41
Skład chemiczny, związki lotne oraz działanie antyoksydacyjne owoców <i>Rosa iberica</i> Stev.	
Wanda Wadas, Izolda Borysiak-Marciniak	
Selected bionutrient contents in spaghetti squash depending on sowing date and plant spacing	55
Zawartość wybranych biopierwiastków w dyni makaronowej w zależności od terminu siewu i rozstawy roślin	
Agnieszka Jamiolkowska, Halina Buczkowska, Ali Hamood Thanoon	
Effect of biological preparations on content of saccharides in sweet pepper fruits	65
Wpływ preparatów biologicznych na zawartość sacharydów w owocach papryki słodkiej	
Veronika Szabó, Lajos Magyar, Károly Hrotkó	
Effect of leaf spray treatments on rooting and quality of <i>Prunus mahaleb</i> (L.) Cuttings	77
Wpływ zabiegów opryskiwania liści na ukorzenienie i jakość sadzonek <i>Prunus mahaleb</i> (L.)	
Semih Kiraci, Hüseyin Padem	
Purple carrot lines has superior technological characteristics in Turkey	89
Linie purpurowej marchwi mające lepsze cechy technologiczne w Turcji	

Małgorzata Malik, Anna Bach

- Morphogenetic pathways from *Narcissus* L. 'Carlton' *in vitro* cultures
of pc stage flower bud explants according to cytokinin and auxin ratios 101
Morfogeneza w kulturach *in vitro* eksplantatów *Narcissus* L. 'Carlton' izolowanych
z pąków kwiatowych w stadium pc w zależności od poziomu cytokininy i auksyny

Augustyn Mika, Zbigniew Buler, Waldemar Treder

- Mechanical pruning of apple trees as an alternative to manual pruning 113
Cięcie mechaniczne jabłoni jako alternatywa dla ręcznego cięcia

Piotr Salachna, Agnieszka Zawadzińska, Cezary Podsiadło

- Response of *Ornithogalum saundersiae* Bak. to salinity stress 123
Reakcja *Ornithogalum saundersiae* Bak. na stres solny

Ali Sabir

- Physiological and morphological responses of grapevine (*V. vinifera* L. cv. 'Italia')
leaf to water deficit under different rootstock effects 135
Fizjologiczne i morfologiczne reakcje liści winorośli (*V. vinifera* L. cv. 'Italia')
na deficyt wody pod wpływem różnych podkładek

Ewa Rożek, Renata Nurzyńska-Wierdak, Andrzej Sałata,**Piotr Gumiela**

- The chemical composition of the essential oil of leaf celery (*Apium graveolens* L. var.
Secalinum alef.) under the plants' irrigation and harvesting method 149
Skład chemiczny olejku eterycznego selera listkowego (*Apium graveolens* L. var.
Secalinum alef.) pod wpływem nawadniania roślin i metody zbioru